



BLEFAROPLASTICA

INDICATA PER I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:

- eccesso cutaneo delle palpebre superiori
- borse o accumuli adiposi inferiori o superiori
- occhiaie e invecchiamento della cute a livello delle orbite
- disturbi della vista per cedimento palpebrale o per lacrimazione continua

INTERVENTO

L' intervento di [blefaroplastica](#), la cui durata prevista è di circa 1 ora, viene eseguito in anestesia locale ambulatorialmente. In alcuni casi, in pazienti molto emotivi, è possibile associare una leggera sedazione. Al termine dell'intervento viene applicata una medicazione leggera consistente in impacchi di garze imbevute di soluzione fisiologica fredda e pomate.

DECORSO POST-OPERATORIO

Durante il periodo postoperatorio è importante evitare l'esposizione al sole delle ferite per non causare un gonfiore eccessivo e il rischio di iperpigmentazione delle cicatrici; a tal fine è opportuno proteggere le palpebre con occhiali da sole.

E' necessario seguire la terapia antibiotica e antiinfiammatori prescritta dal chirurgo per la settimana successiva.

Dopo l'intervento saranno presenti edema (gonfiore) ed ecchimosi, anche asimmetrici, destinati a scomparire dopo 1-2 settimane. Occasionalmente si potranno avvertire difficoltà nell'occlusione totale delle palpebre e una lacrimazione eccessiva.

Dopo sette giorni si rimuovono i fili di sutura. Le normali attività quotidiane possono essere riprese già dal secondo giorno, avendo cura però di evitare per un certo tempo tutte le cause di affaticamento visivo (televisione, lettura, fumo). Il maquillage (trucco) è consentito dopo dieci giorni.

Quanto all'evoluzione delle cicatrici, esse entrano nella fase di arrossamento dopo un periodo di uno o due mesi, per poi schiarirsi velocemente assumendo l'aspetto definitivo dopo tre o quattro mesi. Esse saranno comunque praticamente invisibili in quanto nascoste nelle pieghe naturali delle palpebre stesse.

La **blefaroplastica** può avere anche una finalità funzionale. Infatti, se alla caduta della palpebra si associa una ptosi meccanica o se le ernie adipose (*borse sotto gli occhi*) comportano lacrimazione continua o visione doppia l'intervento, diventa necessario per correggere una eventuale riduzione del campo visivo. Solo in questi casi è previsto un eventuale rimborso assicurativo.

Dr. Med. Marco Castelli

Specialista FMH Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Via Romagnosi, 12 - 21100 Varese (VA) | Tel. +39 0332 231541 - Mob. +39 348 7144122
Via Beltramina, 3 - 6900 Lugano (CH) | Tel. +41(0) 91 972 21 21 - Mobile: +41(0) 79 833 80 78

www.castellimarco.com - info@castellimarco.com