



LABIOPLASTICA

INDICATA PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:

- labbra sottili
- labbra asimmetriche

Per [modellare le labbra](#) senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico si utilizza un filler (acido ialuronico); il filler è riassorbibile e pertanto il trattamento andrà ripetuto solitamente ogni 4-6 mesi. Se si desidera invece un risultato più visibile, ma soprattutto duraturo nel tempo, è necessario sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica di *lipofilling* o *innesto dermoadiposo*.

VISITA PREOPERATORIA

E' necessario uno studio accurato del volto per valutare le motivazioni che possono far preferire l'intervento di lipofilling ad altre metodiche quali le *iniezioni di fillers*.

Si prescrivono gli esami ematici di routine e si valutano le condizioni cliniche globali del paziente. Nel corso della visita preliminare è necessario che il chirurgo venga a conoscenza dell'anamnesi completa del paziente e delle terapie farmacologiche in atto. Il paziente deve poi sottoporsi agli esami clinici pre-operatori prescritti.

INTERVENTO

La [labioplastica](#) è eseguita in semplice anestesia locale, eventualmente associata a sedazione per cancellare ogni sensazione fastidiosa.

L'intervento chirurgico consiste in un prelievo di grasso da aree tipiche quali: addome, fianchi, ginocchia ecc. Questo viene quindi centrifugato e filtrato delicatamente per eliminare le cellule danneggiate o altre componenti inutilizzabili e successivamente iniettato nello spessore delle labbra.

DECORSO POST-OPERATORIO

E' necessario seguire la terapia antibiotica e antiinfiammatori prescritta dal chirurgo per una settimana.

L'intervento causa, invariabilmente, un certo gonfiore che può persistere per alcuni giorni, ma in generale si avrà un tempo di recupero molto veloce e la ripresa della normale vita di relazione avverrà in tempi rapidi.