



LIFTING DELLE COSCE E DEI GLUTEI

INTERVENTO RICHIESTO E INDICATO PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:

- cosce flaccide per dimagrimento notevole
- cosce molli causate dal rilassamento dei tessuti
- adiposità diffusa

VISITA PREOPERATORIA

Nel corso della visita preliminare è necessario che il chirurgo venga a conoscenza dell'anamnesi completa del paziente e delle terapie farmacologiche in atto. Prima dell'intervento la paziente deve sottoporsi ai normali esami di routine previsti per un intervento chirurgico in anestesia generale. Per questo tipo d'intervento vigono regole imperative: la sospensione assoluta del fumo almeno due settimane prima e due dopo l'intervento e l'astensione all'assunzione di aspirina e altri farmaci anti-infiammatori che possono aumentare il rischio di sanguinamento.

INTERVENTO

L'intervento di [lifting cosce e glutei](#) si svolge di solito in anestesia generale e dura due ore circa. La paziente deve prevedere mediamente un ricovero in clinica della durata di due giorni.

Da un punto di vista estetico l'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di ottenere una superficie interna delle cosce più liscia e levigata e glutei più tonici. L'intervento, però, è bene saperlo, lascia inevitabilmente delle cicatrici. Più precisamente residuano due lunghe cicatrici che partono anteriormente dalla piega inguinale rasentando la zona pilifera, passano all'interno delle cosce in regione perineale e terminano posteriormente nella piega glutea; in alcuni casi può residuare una cicatrice verticale all'interno delle cosce; in ogni caso uno slip di ragionevoli dimensioni potrà nasconderle.

DECORSO POST-OPERATORIO

Dopo la dimissione è importante indossare una guaina elastica modellante per almeno un mese. I punti di sutura vengono rimossi a distanza di venti giorni dell'intervento.

E' importante non fumare durante la convalescenza; il fumo, infatti, oltre ad ostacolare il normale processo di guarigione delle ferite, può scatenare colpi di tosse che possono provocare sanguinamento, con rischio di formazione di ematomi ed eccessiva tensione ai margini delle ferite con conseguente compromissione della qualità delle cicatrici.

Dr. Med. Marco Castelli

Specialista FMH Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Via Romagnosi, 12 - 21100 Varese (VA) | Tel. +39 0332 231541 - Mob. +39 348 7144122
Via Beltramina, 3 - 6900 Lugano (CH) | Tel. +41(0) 91 972 21 21 - Mobile: +41(0) 79 833 80 78

www.castellimarco.com - info@castellimarco.com