



LIPOSUZIONE e LIPOSCULTURA

INTERVENTO RICHIESTO E INDICATO PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:

- accumuli adiposi localizzati addome, fianchi
- accumuli adiposi interno-esterno cosce, ginocchia, polpacci, caviglie
- culotte de cheval
- accumuli adiposi localizzati glutei e cosce
- accumuli adiposi localizzati braccia
- accumulo adiposi nella zona mammaria maschile
- doppio mento o pappagorgia

VISITA PREOPERATORIA

Nel corso della visita preliminare è necessario che il chirurgo venga a conoscenza dell'anamnesi completa del paziente e delle terapie farmacologiche in atto. Prima dell'intervento la paziente deve sottoporsi ai normali esami di routine previsti per un intervento chirurgico in anestesia generale. Per questo tipo di intervento vigono regole imperative: la sospensione assoluta del fumo almeno due settimane prima e due dopo l'intervento e l'astensione all'assunzione di aspirina e altri farmaci anti-infiammatori che possono aumentare il rischio di sanguinamento.

INTERVENTO

La [liposuzione](#) può essere eseguita in anestesia generale, locale con sedazione o loco-regionale.

La tipologia di anestesia viene decisa dallo specialista valutando lo stato di salute del paziente e la complessità dell'intervento chirurgico.

La quantità di grasso asportabile è limitata e è determinata di volta in volta dal chirurgo, sulla base alle caratteristiche della singola paziente. Nel post intervento residuano cicatrici cutanee di minima estensione (pochi millimetri), collocate in corrispondenza dei solchi cutanei naturali e che con il trascorrere del tempo diverranno praticamente invisibili.

Il risultato, pur apprezzabile fin dai primi tempi, si evidenzia in circa 2-3 mesi e si perfeziona nell'arco dei sei mesi successivi.

DECORSO POST-OPERATORIO

Dopo l'intervento è necessario indossare una speciale guaina elasto-compressiva, invisibile sotto i normali indumenti per circa 4 - 6 settimane al fine di mantenere la cute nell'esatta posizione voluta dal chirurgo in sede di intervento.

E' opportuno evitare l'esposizione diretta al sole per almeno un mese. In taluni casi, specie in pazienti non giovani o con pelle anelastica, all'intervento di liposuzione potranno residuare irregolarità e rilassamenti della superficie cutanea e potranno essere opportuni interventi correttivi secondari.

Il ritorno all'attività fisica è consigliabile non prima di un mese dall'intervento. Si rammenta che la liposuzione non è un intervento per correggere le smagliature e/o per perdere peso.

Dr. Med. Marco Castelli

Specialista FMH Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Via Romagnosi, 12 - 21100 Varese (VA) | Tel. +39 0332 231541 - Mob. +39 348 7144122
Via Beltramina, 3 - 6900 Lugano (CH) | Tel. +41(0) 91 972 21 21 - Mobile: +41(0) 79 833 80 78

www.castellimarco.com - info@castellimarco.com